

EP566685

Publication Title:

EP0566685

Abstract:

Abstract not available for EP0566685

Abstract of corresponding document: FR2671356

In a method for describing repertoires of antibodies (Ab) and T cell receptors (TcR) of the immune system of an individual, reverse transcription is carried out on the mRNA contained in a biological sample, separate amplifications are then carried out on the transcription product (or directly on the DNA extracted from the sample) by a PCR type method for each primer pair V, C, where V corresponds to a variable segment of the repertoire of interest and C hybridizes on the constant segment of the repertoire of interest. For each J segment of the labelled repertoire, an elongation step is carried out on each of the amplification products using a specific oligonucleotide of this segment J as primer and the amplification product as matrix. For each elongation product corresponding to a triplet (V, C)J thus obtained, the size of the different elongation products is revealed. The description of the repertoires corresponds to a VCJ triplet and to the element size for each element of the repertoire. Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Courtesy of <http://v3.espacenet.com>

This Patent PDF Generated by Patent Fetcher(TM), a service of Stroke of Color, Inc.

Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - <http://www.sughrue.com>

BEST AVAILABLE COPY



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 5 : C12Q 1/68 // , C07H 21/04 C12N 15/13	A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 92/12260 (43) Date de publication internationale: 23 juillet 1992 (23.07.92)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR92/00014 (22) Date de dépôt international: 9 janvier 1992 (09.01.92) (30) Données relatives à la priorité: 91/00189 9 janvier 1991 (09.01.91) FR (71) Déposants (pour tous les Etats désignés sauf US): INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) [FR/FR]; 101, rue de Tolbiac, F-75013 Paris (FR). INSTITUT PASTEUR [FR/FR]; 28, rue du Docteur-Roux, F-75724 Paris Cédex 15 (FR). (72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (US seulement) : KOURILSKY, Philippe [FR/FR]; 26, rue de Montpensier, F-75001 Paris (FR). PANNETIER, Christophe [FR/FR]; 12, boulevard Vincent-Auriol, F-75013 Paris (FR). COCHET, Madeleine [FR/FR]; 15, avenue Gabriel-Péri, F-92260 Fontenay-aux-Roses (FR).		(74) Mandataire: WARCOIN, Jacques; Cabinet Regimbeau, 26, avenue Kléber, F-75116 Paris (FR). (81) Etats désignés: AT (brevet européen), BE (brevet européen), CA, CH (brevet européen), DE (brevet européen), DK (brevet européen), ES (brevet européen), FR (brevet européen), GB (brevet européen), GR (brevet européen), IT (brevet européen), JP, LU (brevet européen), MC (brevet européen), NL (brevet européen), SE (brevet européen), US. Publiée <i>Avec rapport de recherche internationale.</i> <i>Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si de telles modifications sont reçues.</i>
(54) Title: METHOD OF DESCRIBING REPERTOIRES OF ANTIBODIES (Ab) AND T CELL RECEPTORS (TcR) OF THE IMMUNE SYSTEM OF AN INDIVIDUAL (54) Titre: PROCEDE DE DESCRIPTION DES REPERTOIRES D'ANTICORPS (Ab) ET DES RECEPTEURS DES CELLULES T (TcR) DU SYSTEME IMMUNITAIRE D'UN INDIVIDU (57) Abstract <p>In a method for describing repertoires of antibodies (Ab) and T cell receptors (TcR) of the immune system of an individual, reverse transcription is carried out on the mRNA contained in a biological sample, separate amplifications are then carried out on the transcription product (or directly on the DNA extracted from the sample) by a PCR type method for each primer pair V, C, where V corresponds to a variable segment of the repertoire of interest and C hybridizes on the constant segment of the repertoire of interest. For each J segment of the labelled repertoire, an elongation step is carried out on each of the amplification products using a specific oligonucleotide of this segment J as primer and the amplification product as matrix. For each elongation product corresponding to a triplet (V, C)J thus obtained, the size of the different elongation products is revealed. The description of the repertoires corresponds to a VCJ triplet and to the element size for each element of the repertoire.</p> (57) Abrégé <p>La présente invention concerne un procédé de description des répertoires d'anticorps (Ab) et de récepteurs des cellules T (TcR) du système immunitaire d'un individu, caractérisé en ce que: à partir d'un prélèvement biologique, on effectue la transcription inverse des mARN qu'il contient; on effectue ensuite, sur le produit de transcription (ou directement sur l'ADN extrait de l'échantillon), des amplifications séparées par une méthode de type PCR pour chaque couple d'amorce V, C, V correspondant à un segment variable du repertoire en cause et C s'hybridant au segment constant du repertoire étudié; sur chacun de ces produits d'amplification on effectue, pour chaque segment J du repertoire marqué, une étape d'élongation utilisant comme amorce un oligonucleotide spécifique de ce segment J et le produit d'amplification comme matrice; pour chaque produit d'élongation correspondant à un triplet (V, C)J ainsi obtenu on fait apparaître la taille des différents produits d'élongation; la description des répertoires correspondant pour chaque élément du repertoire à un triplet VCJ et à la taille de l'élément.</p>		

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Autriche	ES	Espagne	MG	Madagascar
AU	Australie	FI	Finlande	ML	Mali
BB	Barbade	FR	France	MN	Mongolie
BE	Belgique	GA	Gabon	MR	Mauritanie
BF	Burkina Faso	GB	Royaume-Uni	MW	Malawi
BG	Bulgarie	GN	Guinée	NL	Pays-Bas
BJ	Bénin	GR	Grèce	NO	Norvège
BR	Brésil	HU	Hongrie	PL	Pologne
CA	Canada	IT	Italie	RO	Roumanie
CF	République Centrafricaine	JP	Japon	RU	Fédération de Russie
CG	Congo	KP	République populaire démocratique de Corée	SD	Soudan
CH	Suisse	KR	République de Corée	SE	Suède
CI	Côte d'Ivoire	LI	Liechtenstein	SN	Sénégal
CM	Cameroon	LK	Sri Lanka	SU	Union soviétique
CS	Tchécoslovaquie	LU	Luxembourg	TD	Tchad
DE	Allemagne	MC	Monaco	TG	Togo
DK	Danemark			US	Etats-Unis d'Amérique

PROCEDE DE DESCRIPTION DES REPERTOIRES D'ANTICORPS (Ab) ET DES RECEPTEURS DES CELLULES T (TcR) DU SYSTEME IMMUNITAIRE D'UN INDIVIDU.

La présente invention concerne un procédé permettant la description du répertoire immunitaire d'un individu et, ainsi, la mise en évidence et/ou le suivi de certains états pathologiques.

Une caractéristique essentielle du système immunitaire est la capacité de reconnaître spécifiquement un grand nombre d'antigènes. Chez les vertébrés, les lymphocytes T et B assurent principalement cette fonction de reconnaissance, au moyen d'au moins trois complexes moléculaires transmembranaires ; l'immunoglobuline pour les cellules B, et les deux récepteurs T pour les lymphocytes T : le récepteur $\alpha\beta$ et le récepteur $\gamma\delta$ qui définissent ainsi deux sous-populations parmi l'ensemble des lymphocytes T (Wilson et al., 1988 ; Raulet, 1989).

A la formidable variété des antigènes à reconnaître, correspond une très grande diversité potentielle de ces trois types de récepteurs. En effet, ces trois complexes moléculaires, de structure voisine, sont composés de deux (pour chacun des récepteurs T) ou quatre (pour les immunoglobulines) chaînes peptidiques dont les domaines NH₂-terminaux sont très variables. C'est l'existence d'une interaction forte entre un déterminant antigénique donné et le site constitué par ces domaines variables, qui constitue la traduction à l'échelle moléculaire du phénomène de reconnaissance. C'est ainsi que les informations contenues dans le génome d'une souris lui permettent de produire potentiellement au moins 10^{11} immunoglobulines de région variable différente, 10^{15} récepteurs $T\alpha\beta$ différents, et 10^{18} récepteurs $T\gamma\delta$ différents.

Ainsi émerge la notion de répertoire : l'ensemble des régions variables des immunoglobulines présentes à un instant donné dans un organisme constitue le répertoire actuel des immunoglobulines. De même, l'ensemble des régions variables des récepteurs $T\gamma\delta$ pouvant être éventuellement produites par un génome de souris constitue le répertoire potentiel des lymphocytes $\gamma\delta$.

Le système immunitaire contient donc, en fait, trois répertoires complexes, du fait que le répertoire des récepteurs T doit être subdivisé en répertoire des récepteurs $T\alpha\beta$ et des récepteurs $T\gamma\delta$.

Les mécanismes qui permettent de produire l'immense diversité des récepteurs des lymphocytes T et B sont maintenant bien connus (Tonegawa, 1983). La région variable d'une immunoglobuline ou d'un

récepteur T est formée par les domaines NH₂-terminaux de deux chaînes peptidiques. Les gènes codant pour ces deux protéines sont le résultat de réarrangements somatiques qui juxtaposent un segment V, un ou deux segments D selon les chaînes, et un segment J. Le nombre de segments V, D et J disponibles dans les différents loci fournit une première source de diversité dite diversité combinatoire (cf tableau 1). De plus, l'imprécision des jonctions entre deux de ces segments (jonctions V-D, D-D, D-J ou V-J) introduit une deuxième source de diversité dite diversité jonctionnelle, puisque d'une part, chacune des deux extrémités juxtaposées peut se trouver amputée de quelques bases, et que d'autre part, peuvent être insérés des nucléotides au site de la jonction. Enfin, dans le cas des gènes codant pour les immunoglobulines, des mutations somatiques peuvent se produire dans le deuxième exon du gène réarrangé, ce qui constitue une troisième source de diversité.

Selon le type de récepteur $\alpha\beta$, $\gamma\delta$ ou immunoglobuline, chacune de ces trois sources de diversité est une composante plus ou moins importante de la diversité totale. Ainsi, alors que le nombre de segments V, D et J disponibles est le plus faible dans le cas du récepteur $\gamma\delta$, l'étendue du répertoire de ce récepteur reste potentiellement très grande. Ceci provient essentiellement du fait que le gène codant la chaîne δ peut comprendre zéro, un ou deux éléments D, qui peuvent de plus être lus dans les trois phases de lecture, alors que les chaînes V_H et β comptent un et un seul élément D. En fait, la diversité du répertoire des récepteurs $\gamma\delta$ peut être décrite de la façon suivante : il semble qu'un faible nombre de segments V et J soit disponible, mais le nombre de segments V de la chaîne δ est encore mal connu et il existe une très grande diversité jonctionnelle potentielle qui se traduit par une variation importante de la longueur du deuxième exon du gène réarrangé, surtout dans le cas du gène codant pour la chaîne δ (Raulet, 1989).

La fonction des lymphocytes T $\alpha\beta$ est relativement bien connue : ils interviennent dans la cytolyse par les cellules tueuses, dans les réactions qui règlent la synthèse des anticorps et dans des phénomènes inflammatoires. La fonction des lymphocytes T $\gamma\delta$ est encore mal comprise : on admet en général qu'outre leur rôle probable dans l'ontogénie du

système immunitaire, les cellules T $\gamma\delta$ participent à la surveillance immunitaire. Quant aux diverses fonctions des anticorps, elles sont relativement bien connues et ne seront pas rappelées ici.

5 Nul n'est aujourd'hui capable de décrire l'ensemble des anticorps et des récepteurs T (i.e. les répertoires des Ab et des TcR) exprimés à un moment donné dans un individu. Il s'agit d'une tâche formidable puisque chacun des répertoires comporte vraisemblablement des millions de molécules différentes. On ne dispose encore que d'un faible nombre de réactifs capables de reconnaître spécifiquement tel ou tel
10 élément de tel répertoire. On peut certes opérer plus finement en déterminant la séquence d'un certain nombre de gènes exprimés. Toutefois, des considérations pratiques font qu'il n'est guère concevable d'analyser, en routine, plus d'une dizaine ou, peut-être, d'une centaine de gènes, et l'opération est coûteuse et très longue. En bref, on ne décrit, à l'heure
15 actuelle, les répertoires d'anticorps et de récepteurs T qu'au moyen d'un petit nombre de paramètres. On ne dispose donc pas de méthodes qui permettent d'analyser rapidement et efficacement des situations physiologiques et pathologiques liées à l'état de ces répertoires. Par exemple, il est clair que ces répertoires varient au cours d'une immunisation volontaire
20 (vaccin), ou au cours de l'infection par des microorganismes pathogènes, ou encore dans l'évolution de pathologies auto-immunes. Dans ce dernier cas, il y a de nombreuses raisons de penser que la prédisposition à ces maladies est le reflet d'une certaine composition des répertoires. Il est donc très probable qu'une bonne méthode d'analyse des répertoires aurait des
25 retombées médicales, et pourrait fonder des techniques d'analyse médicale et de diagnostic.

Une méthode maintenant très utilisée dans le but d'étudier la diversité et la distribution des trois répertoires immunoglobulines, récepteurs $\alpha\beta$ et $\gamma\delta$, est celle de l'amplification par PCR (Polymerase
30 Chain Reaction). Cette technique consiste à amplifier l'ADN génomique ou l'ADN complémentaire avec une série de couples d'amorces spécifiques (V,C) ou (V,J) et le cas échéant, de cloner puis de séquencer les produits d'amplification obtenus (Takagaki et al., 1989) ; Asarnow et al., 1989). Cette méthode puissante n'est pas exempte d'artefacts. Sans même parler
35 des problèmes liés à la quantification, il semble par exemple hasardeux de

déduire de deux amplifications réalisées avec deux couples d'amorces différents, (V1, C) et (V2, C) par exemple, un usage préférentiel d'un segment par rapport à l'autre dans la population étudiée (Rajasekar et al., 1990). Dans l'état actuel de la technique, il est difficile de déterminer par
5 cette méthode le taux d'usage des différents segments V. D'autre part, le clonage des produits d'amplification en vue de déterminer leur séquence peut également générer des artefacts. Par exemple, une certaine proportion de ces produits sont en fait des hétéroduplexes (si la population amplifiée est hétérogène) dont on ne peut prédire comment il seront "réparés" après
10 transformation de la bactérie (Abastado et al., 1984, 1987).

Un perfectionnement récent est l'amplification suivant la technique de la PCR ancrée, qui consiste à réaliser l'amplification d'une population hétérogène d'ADN complémentaires à l'aide d'un couple unique d'amorces, l'une s'hybridant dans la région constante C, l'autre avec une
15 séquence identique ajoutée en 3' de tous les brins d'ADN complémentaires. On peut donc espérer que le rendement de l'amplification ne dépende pas du segment V utilisé dans le réarrangement.

Récemment, une méthode assez sensible permettant d'évaluer le taux d'usage des différents segments V dans une population de transcrits
20 hétérogènes a été développée (Okada et Weissman, 1989 ; Singer et al., 1990). Cette méthode précise et reproductible a l'avantage d'être simple conceptuellement donc d'introduire peu de biais. Cependant, elle ne permet ni de définir simultanément l'usage V et l'usage J, ni de déterminer si le transcrit révélé est en phase.

Parallèlement à l'amplification à partir de populations polyclonales, une autre démarche largement utilisée a consisté à construire
25 des banques d'hybridomes ou de lignées T clonales, puis de caractériser au niveau moléculaire les anticorps ou les récepteurs T exprimés. Cette méthode est évidemment difficile à mettre en oeuvre à grande échelle. Elle
30 introduit des biais difficiles à évaluer, lors des étapes de fusion ou de clonage, mais est la seule technique actuelle permettant de déterminer simultanément la séquence des deux chaînes d'une récepteur T ou de déterminer un répertoire d'une spécificité connue.

Il faut noter que les méthodes citées plus haut caractérisent
35 toutes le répertoire à partir de l'ARN messager et non pas de la protéine.

de sorte que tout contrôle post-transcriptionnel est méconnu. L'utilisation d'anticorps monoclonaux et de la cytofluorométrie en flux permet d'analyser le répertoire au niveau du récepteur même et donne simultanément de multiples renseignements sur le phénotype des cellules étudiées.

5 Cependant, cette méthode est assez peu sensible, et surtout, ne permet pas d'étudier dans le détail le répertoire puisqu'il est impossible, faute de réactifs, d'accéder à la diversité jonctionnelle du répertoire. Elle nécessite de plus de disposer d'une batterie importante d'anticorps monoclonaux bien caractérisés.

10 La présente invention a plus particulièrement pour objet un procédé permettant la description du répertoire immunitaire d'un individu, qui puisse être facilement automatisé, prenne en compte un très grand nombre de paramètres et soit dépourvu des biais des procédés décrits précédemment.

15 Plus précisément, la présente invention concerne un procédé de description des répertoires d'anticorps (Ab) et de récepteurs des cellules T (TcR) du système immunitaire d'un individu, caractérisé en ce que :

- à partir d'un prélèvement biologique, on effectue la transcription réverse des mARN qu'il contient,
- 20 - on effectue ensuite, sur le produit de transcription ou directement sur l'ADN extrait de l'échantillon, des amplifications séparées par une méthode de type PCR pour chaque couple d'amorce V,C, V correspondant à un segment variable du répertoire en cause et C s'hybridant au segment constant du répertoire étudié,
- 25 - sur chacun de ces produits d'amplification on effectue, pour chaque segment J du répertoire, une étape d'élongation utilisant comme amorce un oligonucléotide marqué spécifique de ce segment J et le produit d'amplification comme matrice,
- 30 - pour chaque produit d'élongation correspondant à un triplet (V,C)J ainsi obtenu on fait apparaître la taille des différents produits d'élongation, au nucléotide près, par les procédés généralement utilisés pour la détermination des séquences d'ADN,
- la description des répertoires correspondant, pour chaque élément du répertoire, à un triplet V,C,J et à la taille de l'élément.

35

Une alternative consiste à extraire l'ADN de l'échantillon biologique et à pratiquer l'amplification sur l'ADN dénaturé, en utilisant le fait que les réarrangements productifs rapprochent le segment variable de la région constante, de sorte que seuls les segments variables utilisés
5 servent efficacement dans l'amplification.

Le procédé selon l'invention peut être utilisé aussi bien pour décrire l'un des trois répertoires ou bien les trois ou seulement deux d'entre eux. Dans ce qui suit, on décrira particulièrement le répertoire $T\gamma\delta$ mais la même méthodologie est utilisable pour le répertoire $T\alpha\beta$ et les
10 immunoglobulines.

Par "description du répertoire" on entend désigner aussi bien un état sous forme de tableau, bi ou tridimensionnel, qu'une représentation graphique et/ou des reproductions de gel par exemple.

En effet, l'un des intérêts de la présente invention est de
15 pouvoir comparer ces répertoires, en particulier à des états de répertoire type pouvant être liés à des physiologies ou des pathologies déterminées ou bien de suivre l'évolution de ces répertoires dans l'apparition et/ou l'évolution de certaines maladies telles que certains cancers, maladies autoimmunes ou SIDA. Par exemple, au cours de la réaction immunitaire
20 qui survient dans au moins quelques types de cancers, la détection rapide des lymphocytes infiltrant les tumeurs (TIL), l'observation de leur évolution, ainsi que du reste du répertoire au cours d'un traitement par immunothérapie pourrait se révéler une approche intéressante. On peut envisager d'appliquer la puissance de la méthode à l'étude de l'évolution du
25 répertoire au cours du développement d'une maladie autoimmune. On sait en effet que dans nombre de maladies autoimmunes, les lymphocytes T tiennent une importance de premier plan. Si l'on devait, à la suite d'études réalisées dans les quelques modèles animaux disponibles, observer des corrélations strictes entre certaines de ces pathologies et un état ou une
30 suite d'états du répertoire mesurés selon la méthode présentée, il serait alors parfaitement envisageable de donner une valeur prédictive à cette méthode d'analyse, et par conséquent une valeur de diagnostic plus précoce que les tests actuellement disponibles. Ce procédé peut donc devenir un outil d'investigation et d'analyse puissant pour l'étude et la surveillance du
35 système immunitaire.

Les méthodologies mises en oeuvre dans ce procédé sont connues dans leurs principes.

Ainsi, dans le prélèvement du patient on préparera l'ARN (ou l'ADN) par des méthodes connues qui pourront dépendre de la nature du
5 prélèvement (sang périphérique ou biopsie par exemple).

La synthèse d'ADN complémentaire par transcription reverse est connue, de même que le procédé permettant de ne transcrire que les mARN messagers présents dans cet ARN total, au moyen d'une amorce poly(T).

10 L'amplification peut être réalisée par une méthode de type PCR, c'est-à-dire par la méthode PCR ou par l'une de ses nombreuses variantes.

Le procédé est mis en oeuvre, de préférence, par PCR (polymerase chain reaction) et sans addition d'aucun traceur radioactif, coloré ou fluorescent. On amplifie l'ADN, pouvant provenir aussi bien d'une
15 prise de sang que d'un autre prélèvement ou biopsie, toutefois le prélèvement initial doit contenir un nombre suffisamment élevé de cellules pour que les résultats ultérieurs soient statistiquement significatifs. L'amplification démarre par une étape de transcription reverse (ou à partir
20 de l'ADN extrait des cellules prélevées). Après quoi, on divise l'échantillon et on procède à autant de réactions d'amplification séparées qu'il y a de couples d'oligonucléotides (V,C).

On subdivise alors chacun des échantillons de façon à pratiquer, pour chacun d'entre eux, autant de réactions dites d'élongation ou de "run-off" qu'il y a de segments J. Pour effectuer ces réactions, on
25 utilise des oligonucléotides spécifiques de ces segments J qui, cette fois, sont marqués, soit avec un traceur radioactif, soit, plus avantageusement, avec un fluorophore ou par d'autres méthodes. Dans la réaction de "run-off", la polymérase recopie jusqu'au bout les segments amplifiés à
30 partir de l'oligonucléotide J. Si ceux-ci sont hétérogènes en longueur, on obtient donc un ensemble de molécules marquées à leur extrémité J et dont on peut mesurer la taille avec précision.

Cette mesure de taille peut être faite sur des gels de séquence d'ADN conventionnels si l'on a effectué un marquage radioactif
35 ou, avantageusement, avec un séquenceur automatique, notamment capable

FEUILLE DE REMPLACEMENT

de détecter les fluorophores. L'appareil est donc utilisé uniquement pour mesurer les longueurs et l'intensité des produits d'élongation. Bien entendu, puisqu'il existe quatre fluorophores commerciaux de "couleurs" différentes, on pourra, comme il est fait dans les déterminations de séquence d'ADN, mais pour des raisons totalement différentes, mélanger les produits de quatre réactions différentes utilisant des fluorophores différents. Par exemple, il pourra être particulièrement utile de mélanger les produits de réactions homologues faites sur un échantillon témoin et marqués avec une couleur donnée, avec ceux de trois échantillons à étudier. De cette façon, on obtient une comparaison directe des échantillons au témoin, mais d'autres schémas expérimentaux sont possibles. Certains appareils commerciaux pratiquent une analyse des quatre couleurs dans 24 pistes simultanément (soit 96 échantillons). L'analyse prend quelques heures et les résultats sont informatisés.

Grâce à l'utilisation d'un séquenceur, on peut simplifier la lecture des autoradiogrammes dans la séquence conventionnelle qui est longue. Dans le cas précis décrit dans l'exemple, il faut lire chaque expérience, mémoriser et interpréter plus de 1 000 éléments. Dans le cas d'un séquenceur automatique, l'information est immédiatement mise en mémoire et l'utilisation des logiciels existants ainsi que d'un logiciel écrit dans le cadre de l'invention permet d'obtenir la matrice des résultats.

On notera que les problèmes pratiques sont encore plus considérables pour le répertoire $\alpha\beta$ de la souris où il est question d'analyser quelque 60 000 éléments. Le problème du répertoire β est totalement soluble selon la stratégie adoptée pour les répertoires γ et δ . Le problème du répertoire α est ardu (5 000 échantillons à analyser pour chaque répertoire) mais des stratégies simplificatrices peuvent être développées. Il en va de même pour les répertoires d'anticorps et les répertoires humains.

Parmi les appareils aisément adaptables, il faut citer le séquenceur modèle 373A commercialisé par la société Applied Biosystems et les modèles apparentés.

Grâce au logiciel élaboré dans le cadre de l'invention, les données sont organisées, soit dans une représentation à trois dimensions (éléments génétiques dans le plan, longueur dans la hauteur), soit dans un

5 tableau à deux dimensions. Cette représentation est préférable en ce qu'elle permet, dans une matrice de points, de figurer l'abondance du produit de réaction (par exemple, le point est plus ou moins foncé selon l'intensité de la bande détectée par le séquenceur) et ensuite de comparer aisément deux matrices (deux répertoires différents, deux états du même répertoire, etc...)

10 Une amélioration possible consiste à introduire un quatrième paramètre permettant d'analyser encore plus finement le répertoire. Il faut rappeler que cette notion de résolution est capitale, si l'on veut pouvoir analyser des évolutions dans le répertoire actuel. En effet, plus le nombre de paramètres de mesure est important, plus la résolution est grande, et plus les chances de pouvoir saisir des variations fines du répertoire sont importantes. Ce quatrième paramètre donne accès, comme le troisième, à la diversité jonctionnelle. Il s'agit d'appliquer aux produits de "run-off" une
15 méthode d'électrophorèse réalisée en gradient de température ou de tout autre facteur dénaturant, de sorte que les produits de même taille soient séparés selon leur plus ou moins grande homologie avec une sonde fixe (Riesner et al., 1989). C'est donc un accès indirect à la séquence des régions variables qui est recherché. Des expériences sont en cours en
20 utilisant comme sonde les gènes réarrangés dans des hybridomes.

Les exemples ci-après sont destinés à mettre en évidence d'autres avantages et caractéristiques de la présente invention.

Sur les figures ci-annexées,

- 25 - la figure 1 représente une partie du répertoire $T\gamma S$ dans le thymus (T), la rate (R) d'une souris Balb/c adulte et le placenta (P) d'une souris FI (C3H x C57/B16),
 - la figure 2 représente l'analyse, sur gel dénaturant, des produits d'élongation obtenus avec différentes amorces $J\beta$ sur de l'ADN extrait de ganglions amplifié par PCR avec des amorces spécifiques des segments $V\beta$ et $C\beta$:
30 A et B : souris B10.A immunisées avec le cytochrome C de pigeon:
 - 1 = non immunisées
 - 2 = après immunisation primaire
 - 3 = restimulation in vitro, après immunisation primaire ;
- 35

C : souris C3H immunisées par le cytochrome C de pigeon:

4, 5, 6 = trois souris différentes non immunisées

7 = restimulation in vitro après immunisation primaire d'un groupe de souris,

5 les chiffres indiqués à droite ou à gauche des figures correspondent à la taille (en nucléotides) des produits allongés obtenus pour une combinaison $V\beta$ - $J\beta$ productive.

Matériels et méthodes

Oligonucléotides

10 Les oligonucléotides utilisés ont été synthétisés sur un automate 381A DNA Synthesier (Applied Biosystems). Le décrochage de la colonne et le déblocage des fonctions phosphates (protégées par un groupement bêta-cyanoéthyl) s'effectuent en injectant dans la colonne 1,5 ml d'ammoniaque 28 % à raison de 0,5 ml par 30 mn. L'éluat est incubé
15 pendant 12 heures à 56°C afin de déprotéger les bases de l'oligonucléotide (élimination des groupements benzoyl et isobutyryl). Après lyophilisation, l'oligonucléotide est resuspendu dans de l'eau, à une concentration de 50 μ M.

Souris, cellules

20 Souris : Toutes les souches utilisées (Balb/c, Balb/b, DBA/2, CB 20, SJL et C3H/He) proviennent de l'animalerie de l'Institut Pasteur. Lorsque des accouplements ont été réalisés, le premier jour de gestation, jour où le bouchon vaginal est détecté, est appelé jour 0.

Cellules : Les hybridomes utilisés (S15, T14, T16, T18)
25 résultent de la fusion de thymocytes d'une souris C3H/He adulte avec le partenaire BW5147 $\alpha^- \beta^-$ (mutant du thymome BW5147 d'AKR, n'exprimant plus le récepteur $\alpha\beta$).

Préparation d'ARN

L'ARN de tissus et de cellules en culture a été préparé selon
30 trois méthodes différentes.

Première méthode, utilisée pour préparer l'ARN de cellules en culture : les cellules sont centrifugées ; le culot obtenu est resuspendu dans 10 ml d'une solution NaCH_3COO - NaCl 10 mM pH 5, 1 % SDS. Après incubation 2 mn à 4°C, 10 ml d'une solution de phénol non tamponnée, à
35 65°C sont ajoutés. L'ensemble est agité fortement pendant 5 mn ; après centrifugation 10 mn à 3 000 rpm, la phase aqueuse est prélevée,

remélangée à un volume de chloroforme-alcool isoamylique. Après centrifugation, l'ARN contenu dans la phase aqueuse est précipité en ajoutant 0,1 volume d'acétate de sodium 3 M pH 5,2 et deux volumes d'éthanol.

5 Deuxième méthode, dite méthode AGPC (Acid Guanidinium thiocyanate-Phenol-Chloroform): utilisable aussi bien pour préparer l'ARN d'un culot de cellules ou d'un organe, cette méthode permet d'éviter dans une très large mesure la dégradation des acides ribonucléiques susceptible d'intervenir dès que les cellules sont lysées. Cependant, des traces d'ADN
10 subsistent dans la préparation, qui peuvent être gênantes dans certaines applications.

La troisième méthode élimine cette contamination par l'ADN en exploitant la différence de densité des acides ribo- et déoxyribonucléiques. La séparation de ces deux espèces est réalisée par ultracentrifugation du
15 lysat en présence d'un gradient discontinu de CsCl: l'ADN est retenu à l'interface du gradient, tandis que l'ARN, plus dense, précipite. Cette méthode permet donc de récupérer à la fois l'ARN et l'ADN d'un tissu ou d'un culot cellulaire. Brièvement, une solution 4M de guanidine thiocyanate est préparée, contenant 0,5 % de Na N-laurylsarcosine, 25 mM EDTA,
20 0,13 % d'anti-foam A. Le gradient de CsCl est composé de 3 ml d'une solution 5,7 M de CsCl, 25 mM de Na acétate pH 5,2, 10 mM EDTA, et de 0,7 ml d'une solution 2,4 M de CsCl, 25 mM de Na acétate pH 5,2, 10 mM EDTA. Le tissu est broyé dans 7 ml de la solution 4 M de guanidine thiocyanate à l'aide d'un homogénéiseur potter, le lysat obtenu est
25 centrifugé 10 mn à 8 000 tr/mn dans un rotor HB-4 pour éliminer les particules solides. Le surnageant est déposé délicatement sur le coussin de CsCl : l'ensemble est mis à centrifuger 24 heures dans un rotor SW 41 à 30 000 tr/mn à 20°C. La phase liquide est alors éliminée (on peut lors de cette étape récupérer l'ADN situé à l'interface) et le culot est resuspendu dans
30 500 µl d'eau et précipité à - 20°C en ajoutant 1 ml d'éthanol et 50 µl de Na acétate 3 M, pH 5,2.

Préparation d'ADN complémentaire

La synthèse de l'ADN complémentaire est réalisée à partir de l'ARN total préparé selon l'une des trois méthodes décrites plus haut. Le
35 tampon utilisé est le même que celui de l'étape d'amplification par PCR

(tampon Cetus). En effet, les différents tampons proposés ne se sont pas révélés d'une efficacité sensiblement supérieure (comparaison par mesure de l'incorporation de dCTP marqué au ^{32}P) ; par contre, la concentration en Mg_2^+ de ces tampons ne permet pas de réaliser l'amplification par PCR sans autre étape intermédiaire. L'oligonucléotide utilisé comme amorce de la polymérisation du brin d'ADN complémentaire est un 15-mer poly-dT. Brièvement, 10 μg d'ARN total, lorsque celui-ci provient d'un organe de souris adulte, ou l'ARN de 10^5 cellules provenant d'une culture ou d'un thymus fœtal, sont mis à incuber 10 mn à 70°C dans 50 μl d'une solution 50 mM KCl, 10 mM Tris-HCl pH 8,2, 1,5 mM MgCl_2 , 0,01 % gélatine, 0,1 mM EDTA, 5 μM pdT(15), 0,2 mM dNTP. Puis, après 5 mn sur la glace, 5 unités d'AMV RT (Proméga ou Boehringer) sont ajoutés, ainsi que 34 unités de RNasin (Pharmacia) ; le tout est incubé 1 h à 43°C , porté à 100°C pendant 5 mn.

15

Amplification par la technique PCR

Les amplifications ont été réalisées sur les automates Perkin Elmer Cetus et Prem, selon la technique décrite (Saiki et al., 1988).

Pour amplifier l'ADN complémentaire le protocole utilisé fut le suivant : 5 μl de la solution préparée précédemment sont amplifiés dans 50 ou 100 μl d'une solution 50 mM KCl, 10 mM Tris-HCl, pH 8,2, 0,01 % gélatine, 0,2 μM en chacun des deux oligonucléotides utilisés, 2 u par 100 μl de Taq Polymérase (Beckman), 200 μM en chacun des nucléotides dATP, dGTP, dCTP et dTTP. La concentration en ion Mg^{2+} utilisée varie de 2 à 2,5 mM. Le tout est recouvert de 50 μl d'huile minérale, chauffé 10 mn à 80°C , amplifié par 40 cycles (1 mn à 94°C , 1 mn à 60°C , 1 mn à 72°C) puis incubé 10 mn à 72°C .

Parmi les paramètres permettant de réduire le bruit de fond du procédé, il faut citer l'utilisation de concentrations optimales d'ions magnésium dans les étapes d'amplification ou d'élongation, ainsi on utilisera de préférence entre 1 et 3 mM d'ions magnésium.

30

Marquage d'amorces, élongation par "run-off"

Les amorces J utilisées pour réaliser l'étape de "run-off" ont au préalable été radiomarquées par phosphorylation de l'extrémité 5' à l'aide d'un phosphate ^{32}P . Le protocole est le suivant : 100 pmoles de

35

l'oligonucléotide sont incubés dans 10 µl pendant 30 mn à 37°C dans le tampon d'amplification à une concentration de 2,5 mM en Mg^{2+} , en présence de 40 µCi de ^{32}P - ATP (soit 12 pmoles) et de 3 unités de T4 polynucléotide kinase. L'enzyme est ensuite inactivée en portant le tout à 70°C pendant 10 mn.

L'élongation par "run-off" à partir des amorces J marquées est réalisée dans les conditions suivantes. 1 µl du mélange amplifié précédemment est dilué dans 10 µl d'une solution identique à celle qui a été utilisée pour l'amplification (tampon d'amplification avec la concentration optimale de Mg^{2+} (2 à 2,5 mM), 200 µM en chacun des dNTP, 0,2 u de Taq Polymérase), à laquelle on ajoute l'amorce J marquée à la concentration de 1 µM (l'amorce J est donc un excès d'au moins 5 par rapport aux autres amorces V et C apportées par le µl du mélange amplifié). La réaction de "run-off" consiste en 3 mn à 94°C, 1 mn à 60°C suivi de 15 mn à 72°C.

Electrophorèses

L'analyse des produits d'amplification et des séquences est réalisée par une électrophorèse sur gel de 400 µm d'épaisseur, de 6 % polyacrylamide (réticulation : 1 g de bisacrylamide pour 19 g d'acrylamide) dans le tampon TBE (Maniatis et al., 1982) en conditions de dénaturation (95 % formamide, 20 mM EDTA, bleu de bromophénol 0,25 %, xylène cyanol 0,25 %) et incubés 10 mn à 80°C. La migration est réalisée dans le tampon TBE sous un champ électrique de 4 000 Vm^{-1} , pendant 2 h ou 4 h pour l'analyse de séquence, et 5 à 6 h pour l'analyse de produits d'amplification.

Exemple 1 - Etude de la diversité génétique de la chaîne γ du récepteur T chez la souris

Principe de la méthode

Pour chaque chaîne variable ($V\alpha$, $V\beta$, $V\gamma$ ou $V\delta$ pour les récepteurs $T\alpha\beta$ ou $\gamma\delta$), les oligonucléotides spécifiques sont synthétisés et permettent d'amplifier séparément les copies cADN des ARN messagers. Le tableau ci-après donne la liste des oligonucléotides utilisés dans l'analyse suivante. Les transcrits correspondants aux régions variables- $V\gamma 1$, $V\gamma 2$... $V\gamma 7$ sont amplifiés séparément, de même que ceux correspondant à $V\delta 1$, $V\delta 2$... $V\delta 9$. Pour chaque produit d'amplification, une réaction spécifique des segments J est réalisée. Finalement, on mesure la taille des produits sur un gel de séquence. Ceci permet de décomposer les ARN messagers selon la

longueur de la région variable (région N notamment) qui peut varier de 10 à 20 nucléotides environ. En outre, on peut repérer les ARN messagers qui sont hors-phase pour la traduction en protéine. En résumé, un échantillon est paramétré (1) pour l'emploi des chaînes V ; (2) pour l'emploi des segments J et (3) pour la taille.

La diversité génétique, pour les récepteurs $T\gamma\delta$ de la souris, provient du réassortiment de 15 éléments génétiques pour la chaîne γ du récepteur et de 11 éléments de la chaîne δ . Au cours de recombinaisons qui engendrent les gènes actifs de structure V-D-J-C, divers mécanismes opèrent aux jonctions de certains segments recombinés de sorte que la longueur du gène actif est variable dans des limites qui sont de 0 à 20 nucléotides environ pour les gènes $V\gamma-J\gamma-C\gamma$ et de 0 à 50 nucléotides environ pour les gènes $V\delta-J\delta-C\delta$.

Le répertoire du récepteur $T\gamma\delta$ a été paramétré par la détermination : - des segments V, J et C qui sont utilisés, - de la longueur du gène réarrangé.

On voit dans le tableau 1 que ceci représente plus d'un millier de mesures pour les récepteurs $T\gamma\delta$. Dans le cas des récepteurs $T\alpha\beta$, il s'agit de plus de 50 000 mesures.

- Procédé expérimental

Pour le répertoire des récepteurs $T\gamma\delta$ de la souris, sont synthétisés :

- 7 oligonucléotides spécifiques de chaînes $V\gamma$,
- 3 oligonucléotides spécifiques de chaînes $J\gamma$,
- 4 oligonucléotides spécifiques de chaînes $C\gamma$,
- 9 oligonucléotides spécifiques de chaînes $V\delta$,
- 2 oligonucléotides spécifiques de chaînes $J\delta$,
- 1 oligonucléotide spécifique de la chaîne $C\delta$.

Les méthodes de détermination des amorces sont connues, en particulier lorsqu'il existe de fortes homologues entre des séquences que l'on entend distinguer, par exemple $V\gamma 1$, $V\gamma 2$ et $V\gamma 3$.

Le tableau 2 ci-annexé donne la liste des oligonucléotides utilisés.

Les résultats obtenus sont répertoriés à la figure 1 sans l'usage J.

Tableau 1

Immunoglobuline					Récepteur $\alpha\beta$ (1)		Récepteur $\gamma\delta$ (2)	
	Chaîne V_H	Chaîne V_L	Chaîne V_H	Chaîne V_L	Chaîne α	Chaîne β	Chaîne γ	Chaîne δ
Répertoires murins								
Segments V	250-1000	250	2		100	25	7	10
Segments D	12	0	0		0	2	0	2
Segments J	4 + 1	4 + 1	4		50	12	3	2
Régions C	8 isotypes	11	4		1	2	4	1
Div. totale (3)		101			1015		1018	
Répertoires humains (4)								
Segments V	100-200	80	0		60	80	8 + 6	4
Segments D	4	0	0		0	2	0	2
Segments J	6 + 3	5	6		50	13	5	3
Régions C	10 isotypes	1	6		1	2	2	1

(1) Wilson et al. (1988)

(2) Raulet (1989)

(3) Davis and Bjorkman (1988)

(4) Meindl et al. (1990).

Tableau 2

Vy1: AGTTTGAGTATCTAATATATGTCT
 Vy2: ACGACCCCTTAGGAGGGAAGC
 Vy3: TTGAGTATCTAATATATGTGAG
 Vy2 et 3: CGGCAAAAAACAAATCAACAG
 Vy4: TGTCCCTTGCAACCCCTAACC
 Vy5: TGTGCACTGGTACCAACTGA
 Vy6: GGAATTCAAAGAAAACATTGTCT
 Vy7: AAGCTAGAGGGGTCTCTGC

 Jy1: CTGCAAATAACCTTGTGAAAA
 Jy2: CTGCAAATAACCTTGTGAAAG
 Jy4: GAATTACTACGAGCTTTGTC

 Cy1: TTTCAGCAACAGAAGGAAGG
 Cy2: TCCAGGATAGTATTGCCATT
 Cy3: GGAAATGCTCTGCATCAAGCT
 Cy4: GCTTGGGAGAAAAGTCTGAG
 pan-Cy: CTTATGGAGATTTGTTTCAGC

 Vδ1: GGAATTCAGAAGGCAACAATGAAAG
 Vδ2: GGTCCCYGCAGATCCAAGCC
 Vδ3: TTCTGGCTATTGCTCTGAC
 Vδ4: CCGCTTCTGTGGAACCTTC
 Vδ5: CAGATCCCTGCAGTTCATCC
 Vδ6: TCAAGTCCATCAGCCCTGTC
 Vδ7-R(2): GAAAGCTTCAGTGCAAGAGTC
 Vδ7-T: CGCAGAGCTGCAGTGTAAGT
 Vδ8: GCTACAGCACCCCTGCACATC

 Jδ1: TCCACAGTCACTTGGGTTC
 Jδ2: TCCACAAAGAGCTCTATGCC

 Cδ: CGAATTCCACAATCTTCTTG

(1) Les nomenclatures utilisées sont celle de Heilig & Tonegawa (1986) pour le locus γ et celle de Raulet (1989) pour le locus δ . Le choix d'une partie des oligonucléotides provient directement de Takagaki et al. (1989 b).

5 (2) V δ 7-R est l'oligonucléotide spécifique du segment variable V δ 7 référencé dans Raulet (1989) ; V δ 7-T est l'oligonucléotide spécifique du segment variable V δ 7 référencé dans Takagaki et al. (1989 a).

10

15

20

25

30

35

Exemple 2 - Analyse de la diversité génétique du récepteur T $\alpha\beta$

La diversité génétique de la chaîne β du récepteur T sur des ganglions lymphatiques de souris B10.A, après immunisation par le cytochrome C de pigeon constitue un système de référence bien documenté.

5 En particulier, d'après les travaux publiés, on sait que la chaîne β de 75 à 80% des clones isolés après immunisation et restimulation in vitro par l'antigène, est composée du réarrangement V β 3-J β 1.2-C β .

Un échantillon d'ARN messager provenant de ganglions lymphatiques drainant de souris immunisées ou non, a été transformé en
10 cADN. Celui-ci a été amplifié par PCR (Polymerase Chain Reaction) avec un couple d'oligonucléotides situés d'une part dans l'une des régions variables V β et, d'autre part, dans la région constante. Cette opération a été répétée pour chaque région V β (au nombre d'une vingtaine). A la suite de quoi, chaque réaction d'amplification, divisée en 12 échantillons (un pour
15 chaque J β), a servi de matrice pour un cycle d'élongation avec l'un des 12 J β radiomarké.

La figure 2 jointe illustre une partie des résultats obtenus pour les couples V β 1- V β 3 et V β 16-C β , réanalysés avec quatre J β différents dont J β 1.2., sur des souris B10.A (H-2a) dans deux expériences
20 indépendantes (Figures A et B). Dans la figure A, pour le couple V β 3-J β 1.2, on voit apparaître une bande majoritaire dans les cellules T des ganglions restimulés in vitro par le cytochrome C de pigeons (figure A, canal 3). La taille des fragments constituant cette bande est en accord avec les résultats attendus (115 nucléotides pour V β 3-J β 1.2). Ces résultats sont
25 reproductibles d'une expérience à l'autre (figure B) et, de plus, indiquent que la prépondérance du réarrangement V β 3-J β 1.2 est déjà détectable après la première immunisation (figure B, J β 1.2, canal 2).

Il n'est pas exclu de pouvoir faire ce type d'analyse sur une même souris de manière à éviter le problème des variations minimales
30 existant d'une souris à l'autre, ainsi que l'illustre la figure C (canaux 4 à 6).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ABASTADO et al. (1984). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81, 5792-5796
- ABASTADO et al. (1987). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 84, 6496-6500
- ASARNOW et al. (1989). Nature 341, 60-62
- DAVIS and BJORKMAN (1988). Nature 334, 395-402
- MANIATIS et al. (1982). Molecular Cloning: Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory
- MEINDL et al. (1990). Eur. J. Immunol. 20, 1855-1863
- OKADA et WEISSMAN (1989). J. Exp. Med. 169, 1703-1719
- RAJASEKAR et al. (1990). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87, 1767-1771
- RAULET (1989). Ann. Rev. Immunol. 7, 175-207
- RIESNER et al. (1989). Electrophoresis 10, 377-389
- SAIKI et al. (1988). Science 239, 487-491
- SINGER et al. (1990). EMBO J. (in press)
- TAKAGAKI et al. (1989). Nature 339, 712-714
- TONEGAWA (1983). Nature 302, 575-581
- WILSON et al. (1988). Immunological Reviews 101, 149-172

FEUILLE DE REMPLACEMENT

REVENDEICATIONS

1) Procédé de description des répertoires d'anticorps (Ab) et de récepteurs des cellules T (TcR) du système immunitaire d'un individu, caractérisé en ce que :

- à partir d'un prélèvement biologique, on effectue la transcription réverse des mARN qu'il contient,
- on effectue ensuite, sur le produit de transcription (ou directement sur l'ADN extrait de l'échantillon), des amplifications séparées par une méthode de type PCR pour chaque couple d'amorce V,C, V correspondant à un segment variable du répertoire en cause et C s'hybridant au segment constant du répertoire étudié,
- sur chacun de ces produits d'amplification on effectue, pour chaque segment J du répertoire marqué, une étape d'élongation utilisant comme amorce un oligonucléotide spécifique de ce segment J et le produit d'amplification comme matrice,
- pour chaque produit d'élongation correspondant à un triplet (V,C)J ainsi obtenu on fait apparaître la taille des différents produits d'élongation,
- la description des répertoires correspondant pour chaque élément du répertoire à un triplet VCJ et à la taille de l'élément.

2) Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'on fait apparaître les tailles des produits d'élongation par électrophorèse du mélange d'élongation et mise en évidence du marqueur.

3) Procédé selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le marquage est radioactif, colorimétrique ou fluorescent.

4) Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les étapes sont effectuées en présence de 1 à 3 mM d'ion Mg^{2+} .

5) Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'on mesure l'intensité de chaque signal de taille moléculaire afin d'obtenir une mesure quantitative de l'importance de la séquence correspondante.

6) Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'intensité de chaque signal est évaluée par rapport à un étalon interne.

7) Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les produits de même taille moléculaire sont séparés, en fonction de leur plus ou moins grande affinité pour une sonde fixe.

5 8) Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'on effectue cette étape en électrophorèse à gradient de température ou de tout autre agent dénaturant.

9) Procédé selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que pour faire apparaître et décrire les tailles des produits d'élongation on utilise un appareil de séquençage automatique.

10

15



20

25


30

35

1/2



- 2 / 2 -



132 (Vβ1-Jβ2.5)

FIG. 2C

Vγ2-Cγ	Vγ4-Cγ	Vγ5-Cγ	Vγ6-Cγ	Vγ7-Cγ	Vδ1-Cδ	Vδ3-Cδ	Vδ4-Cδ	Vδ5-Cδ	Vδ6-Cδ	Vδ7-Cδ
TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP

FIG. 1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/FR 92/00014

I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (If several classification symbols apply, indicate all) ⁶		
According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC Int.Cl.5 C 12 Q 1/68 // C 07 H 21/04 C 12 N 15/13		
II. FIELDS SEARCHED		
Minimum Documentation Searched ⁷		
Classification System	Classification Symbols	
Int.Cl.5	C 12 Q	
Documentation Searched other than Minimum Documentation to the Extent that such Documents are Included in the Fields Searched ⁸		
III. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT ⁹		
Category ⁹	Citation of Document, ¹¹ with indication, where appropriate, of the relevant passages ¹²	Relevant to Claim No. ¹³
A	Nature, vol. 341, 7 September 1989, D.M. ASARNOW et al.: "Distinct antigen receptor repertoires of two classes of murine epithelium-associated T cells", pages 60-62, see the whole (cited in the application) ---	1-3
A	Chemical Abstracts, vol. 111, 1989, (Columbus, Ohio, US), M.E. ROTH et al.: "Analysis of T cell receptor transcripts using the polymerase chain reaction", see page 176, abstract No 147822p, & BIOTECHNIQUES 1989, 7(7), 746-8, 750, 752-4, see the whole ---	1
A	WO, A, 9004648 (MORLEY et al.) 3 May 1990 ---	
A	Nature, vol. 339, 29 June 1989, Y. TAKAGAKI et al.: "Diversity of gammadelta T- cell receptors on murine intestinal intra-epithelial lymphocytes", pages 712-714 (cited in the application) -----	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>¹⁰ Special categories of cited documents:</p> <p>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>"E" earlier document but published on or after the international filing date</p> <p>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step</p> <p>"Y" document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</p> <p>"Δ" document member of the same patent family</p> </div> </div>		
IV. CERTIFICATION		
Date of the Actual Completion of the International Search		Date of Mailing of this International Search Report
16 April 1992 (16.04.92)		27 May 1992 (27.05.92)
International Searching Authority		Signature of Authorized Officer
European Patent Office		

FR 9200014
SA 56387

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

KIP0 FCRM P0479

Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - <http://www.sughrue.com>

PCT/FR 92/00014

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxième partie) (Janvier 1985)

III. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS ¹⁴(SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SUR LA
DEUXIEME FEUILLE)

Catégorie ^o	Identification des documents cités, ¹⁶ avec indication, si nécessaire des passages pertinents ¹⁷	No. des revendications visées ¹⁸
A	Nature, vol. 339, 29 juin 1989, Y. TAKAGAKI et al.: "Diversity of gammadelta T- cell receptors on murine intestinal intra-epithelial lymphocytes", pages 712-714 (citée dans la demande) -----	

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
RELATIF A LA DEMANDE INTERNATIONALE NO.**

FR 9200014
SA 56387

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche internationale visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 28/04/92
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO-A- 9004648	03-05-90	Aucun	

EPO FORM P0472

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.